



PREPARAZIONE ALL'ESAME TAC CON MEZZO DI CONTRASTO

Per l'esecuzione dell'esame TAC con mezzo di contrasto occorre aver effettuato i seguenti esami ematici:

- **GLICEMIA**
- **AZOTEMIA**
- **CREATININEMIA + velocità di filtrazione (eGFR)**

N.B. gli esami devono essere eseguiti non oltre tre mesi antecedente l'indagine

E' necessario presentarsi in struttura 20 minuti prima dell'appuntamento per effettuare l'accettazione agli sportelli.

IL GIORNO DELL'ESAME IL PAZIENTE, DOVRA' ESSERE **DIGIUNO DA CIBI SOLIDI DA ALMENO 6 ORE** AD ESCLUSIONE DEI FARMACI ABITUALMENTE ASSUNTI.

SI RACCOMANDA IDRATAZIONE: BERE MEZZO LITRO D'ACQUA 1 ORA PRIMA DELL'ESAME.

PORTARE SEMPRE:

- IMPEGNATIVA DEL MEDICO CURANTE (compilata in ogni sua parte) CON L'INDICAZIONE DEL PRECISO QUESITO DIAGNOSTICO
- CARTA REGIONALE dei SERVIZI o TESSERA SANITARIA
- CODICE FISCALE
- CARTA DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'
- ESAMI TAC, RADIOGRAFIE (RX) O ALTRE INDAGINI ESEGUITE IN PRECEDENZA

ATTENZIONE:

- In caso di **allergie al mezzo di contrasto o a farmaci o altre sostanze**, rivolgersi al proprio Medico Curante per valutare la possibilità di indagini alternative.
- Se confermata la necessità di effettuare l'esame, si deve richiedere presso la nostra struttura o scaricare dal sito web (www.gvmnet.it), il protocollo di premedicazione per i soggetti allergici e presentarlo al proprio medico curante.
- Nel caso che i pz. siano in trattamento con ipoglicemizzanti orali con biguanidi (cfr. **metformina**) previo accordo con il diabetologo curante la terapia dovrà essere sospesa 48 h prima e dopo l'esecuzione dell'esame oppure sostituita con altri farmaci ipoglicemizzanti.

Mod. Rad.2.4



ASSUNZIONE DI LIQUIDI IN RELAZIONE AI RISULTATI DELLO STUDIO DELLA FUNZIONALITA' RENALE

Creatininemia < 1,6 mg/dl	Nessuna preparazione specifica:assunzione di liquidi a volontà;consigliata l'assunzione di 500 cc di acqua prima dell'esame e 2000 cc. nelle 24 ore successive
Creatininemia > 1,6 mg/dl	1. Se clearance >60 ml/min:idratazione per os 2000 cc nelle 24 ore successive all'esame o fleboclisi di 500 cc. di soluzione fisiologica 2. Se clearance <60 ml/min e > 30 ml/min :idratazione per os 2000 cc nelle 24 ore successive all'esame + Acetilcisteina cp.effervescenti (Fluimucil da 600 mg) 1 cp 24 ore e 1 cp 12 ore prima dell'esame e 1 cp 12 ore e 1 cp 24 ore dopo l'esame 3. Se clearance <30 ml/min l'esame con mezzo di contrasto è controindicato
Creatininemia > 2 mg/dl	L'esame è <u>controindicato</u> e sarà effettuato solo dopo valutazione nefrologica

Mod. Rad.2.4