



PREPARAZIONE PER LA RISONANZA MAGNETICA DELLA MAMMELLA

Per eseguire la RM della Mammella occorre osservare alcune linee di comportamento affinché l'esame venga ottimizzato e la sua riuscita sia ottimale.

IMPORTANTE: l'indagine RM della mammella va effettuato dal 7 al 14 giorno del ciclo per evitare che la congestione delle mammelle, che fisiologicamente si manifesta in tale periodo, non possa alterare la buona riuscita dell'indagine.

- **Le Pazienti che assumono una terapia anticoncezionale** per poter eseguire la RM della Mammella debbono sospendere tale terapia farmacologica ed attendere il primo flusso mestruale in seguito sottoporsi all'esame RM tra il 7 ed il 14 giorno del ciclo;
- **Le Pazienti in menopausa** possono effettuare l'esame RM in qualunque momento del ciclo mestruale;
- **Le Pazienti che assumono una terapia ormonale sostitutiva** debbono interrompere la terapia 2 mesi prima dell'esame;
- **Le Pazienti che hanno subito un intervento chirurgico alla mammella** possono eseguire la RM dopo almeno 6 mesi dall'intervento chirurgico;
- **Le Pazienti che sono state sottoposte ad un trattamento radioterapico** possono eseguire una esame RM alla mammella dopo 6 mesi dal termine del trattamento radioterapico;
- **Le Pazienti che allattano** devono sospendere l'allattamento nelle 24 ore successive all'esame (o meglio nelle 24 ore successive alla somministrazione di mdc). In tale periodo il latte andrà tirato e non somministrato all'infante;
- **Le Pazienti con pregresse reazioni allergiche al mdc** dovranno sottoporsi ad una terapia medica desensibilizzante;

Il giorno dell'esame è richiesto un digiuno di circa 5 ore e dovrà essere portata in visione l'indagine ematica della CREATININEMIA (VALIDITA' NON OLTRE 30 GIORNI) IMPORTANTE: per concordare un appuntamento nel periodo corretto si consiglia chiamare la segreteria il I giorno del flusso mestruale.

NECESSARIO PORTARE IN VISIONE TUTTI GLI ESAMI MAMMOGRAFICI, ECOGRAFICI ED RM DELLA MAMMELLA PRECEDENTEMENTE ESEGUITI. PORTARE SEMPRE CARTELLE CLINICHE DI PREGRESSI INTERVENTI MAMMARI; OVVERO PREGRESSI TRATTAMENTI RADIO O CHEMIOTERAPICI